

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองโต



จัดทำโดย

กรรมการศึกษา หน่วยผ่าตัดเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน



การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองโต



เป็นการผ่าตัดที่ใช้ยาชาเฉพาะที่



หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้าน และดูแล

แผลที่สถานิอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน



แพทย์จะนัดกลับมาตรวจอีกในครั้งต่อไป




HOME




ระบบน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆและสิ่งแปลกปลอมต่อมนุษย์
เรา

ต่อมน้ำเหลืองโต มีหลายสาเหตุ อาจเกิดจากการติดเชื้อ
ต่างๆ หรือเป็นมะเร็งก็ได้







ระบบน้ำเหลืองมี
เส้น (ท่อ) น้ำเหลือง
เป็นขอบข่ายกระจาย
ทั่วร่างกาย
เหมือนกับเส้นโลหิต
แดงและเส้นโลหิตดำ
โดยแทรกอยู่ตาม
เนื้อเยื่อทั่วไป



ในท่อน้ำเหลืองมีน้ำเหลืองใสและมีเม็ด
หรือเซลล์น้ำเหลืองชื่อ “ ลิมโฟไซต์ ” ซึ่งเป็น
เซลล์สำคัญในการต่อสู้ทำลายเชื้อโรค



ลักษณะของต่อมน้ำเหลืองโตที่คอและเต้านม



การผ่าตัด






1. แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่จะทำ ผ่าตัด
ด้วยน้ำยาทำลายเชื้อโรค

2. คลุมผ้าสะอาดซึ่งผ่านการทำลายเชื้อโรคอย่างถูกวิธี
ไว้บนตัวผู้ป่วย



**3. ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะทำผ่าตัด และ
ทดสอบความรู้สึก ก่อนลงมีดผ่าตัดขนาดจิ๋ว⁺**

4. ทำการผ่าตัดเอาต่อม น้ำเหลืองที่โตออก






5. เย็บปิดแผลด้วยไหมเส้นเล็ก ตัดไหม
หลังผ่าตัด **7** วัน

6. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ

การปฏิบัติตัวขณะผ่าตัด



1. ควรนอนในท่าที่พยาบาลจัดให้ ไม่ดิ้นไปมา
2. ไม่ยกมือขึ้นมาสัมผัสผ้าสะอาดปราศจากเชื้อโรค ที่แพทย์ใช้คลุมบนตัวผู้ป่วย





**3. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ใจเต้น
หายใจไม่สะดวก หัวใจเต้นเร็วแรง ใจไม่
ให้รีบบอกแพทย์ทันที**

**4. ถ้าขณะทำรู้สึก
เจ็บปวดมากทนไม่ได้
ให้รีบบอกแพทย์ได้ทันที**




คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด



1. ดูแลรักษาแผลผ่าตัดให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ โดยทำความสะอาดแผล ทุกวันที่สถานีนอนามัยหรือโรงพยาบาล ใกล้เคียงบ้าน ไม่ควรทำแผลเอง


2. ระวังไม่ให้แผลผ่าตัดเปียกน้ำ เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบได้ ควรระมัดระวังในการอาบน้ำ บริเวณใกล้ๆ แผลผ่าตัด หรือใช้วิธีเช็ดตัว



3. สังเกตแผลผ่าตัดถ้าผิดปกติ
เช่นมีเลือดซึมมาก หรือมีเลือดซึม
ตลอดเวลา หรือแผลอักเสบ บวมแดง มี
น้ำเหลืองซึมลักษณะคล้ายหนอง ให้รีบไป
พบแพทย์ทันที



4. พักผ่อนร่างกายและอวัยวะที่มีแผลผ่าตัด การ
เคลื่อนไหวมากเกินไปจะกระตุ้นแผลผ่าตัดทำให้แผล
หายช้า





**5. ไม่ใช้มือสัมผัสบาดแผล รักษาความสะอาด
ของบาดแผลและร่างกายทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้า
สู่บาดแผล**



**6. งดเหล้า บุหรี่ เครื่องคอง ของมีน
เมาทุกชนิด เพราะทำให้การไหลเวียน
ของเลือดไม่ดี แผลหายช้า**




7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น เนื้อปลา เนื้อหมู
นมถั่วเหลือง เต้าหู้ ผักใบเขียว แครอท
ฟักทอง ผลไม้



8. รับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์ ถ้าเริ่มปวดแผลให้
รับประทานยาแก้ปวดครั้งละ **1-2** เม็ด ซ้ำได้ทุก **4-6** ชั่วโมง




9. ตัดไหมตามกำหนดนัด



10. มาตรวจตามนัดของแพทย์ทุกครั้ง



ดูแลคุณภาพชีวิต พร้อมดวงจิตบริการ



ด้วยความปรารถนาดี

จาก หน่วยผ่าตัดเด็ก

โทร 053 - 935725